

2020年8月改訂

動物用医薬品

好んで食べる虫下し

ネオ 犬の虫下し

犬チョコ

犬を飼育するのに一番大切なことは駆虫です。寄生虫のために体を弱らせ、色々な病気を併発します。仔犬の発育は駆虫を的確に行うかどうかによって左右されると言われています。駆虫は定期的に行いましょう。

特 長

犬が好んで食べるように菓子状になっていますので使用が簡単です。下剤、絶食の必要はありません。

効能又は効果

犬の回虫及び鉤虫（十二指腸虫を含む）の駆除。

用法及び用量

犬の体重に応じて、下記量を1回量として1日1回経口投与する。給餌に関係なく投与することができる。また、下剤を使用する必要はない。

犬の体重		犬の体重	
5 kg	2.5g (本品の 1/8)	25kg	12.5g (本品の 5/8)
10kg	5.0g (// 2/8)	30kg	15.0g (// 6/8)
15kg	7.5g (// 3/8)	35kg	17.5g (// 7/8)
20kg	10.0g (// 4/8)	40kg	20.0g (// 1ヶ)

成 分

本品1個 (20g) 中

クエン酸ピペラジン 1.100g
(クエン酸ピペラジン無水物として 0.95g)
サントニン 0.050g

使用上の注意

【一般的注意】

- (1) 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) 本剤は効能・効果において、定められた目的のみに使用すること。

【使用者に対する注意】

- (1) 誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

【犬に対する注意】

1 制限事項

- (1) 本剤の投与前に健康状態について検査し、異常を認めた場合は投与しないこと。
- (2) 本剤は幼弱及び病中・回復期の動物並びに産前・産後の動物に投与しないこと。
- (3) 3回以上続けて投与しないこと。再度駆虫を必要とする場合は10日以上の間隔をとること。
- (4) 他の駆虫剤と同時に使用しないこと。

2 副作用

- (1) 本剤の使用により、激しい下痢、嘔吐、その他異常が認められた時は使用を中止し、獣医師に相談すること。

【保管上の注意】

- (1) 飲食物、食器、小児の玩具等と区別し、小児の手の届かない所に保管すること。
- (2) 専用紙箱に入れて光を避け、なるべく涼しい所に保管すること。
- (3) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ換えないこと。



製造販売元

内外製薬株式会社

〒639-2200 奈良県御所市1568番地

<http://www.naigai-pet.com>


TEL: 0745-65-1156

(9:00~17:00 土、日、祝日は除く)

上手な虫下しの与え方

【内部寄生虫の種類】


犬回虫




猫回虫




犬鉤虫(いぬこうちゅう)



瓜実条虫(うりざねじょうちゅう)



瓜実条虫(拡大図)



※弊社虫下し商品は、条虫には効果がありません。

【使用に際しての注意】

投与量は体重により違いますので、各製品の添付文書に記載された用量をお守りください。
また、製剤によりそれぞれ効能・効果が違いますので、ご注意ください。

生後3ヵ月以上の生体にはご使用いただけますが、体調や健康状態が悪い場合はご使用をお控えください。

なお、「ネオ 犬の虫下し犬チョコ」「犬チョコシロップ」は犬専用となっております。猫には使用しないで下さい。

虫下しは基本的には、糞便検査後の投与となりますが、糞便中または肛門周囲に成虫が認められる場合は以下の方法をおすすめします。

消化管内に寄生虫が存在するか明確でない場合は、1回のみの投与を推奨します。

【ネオ 犬の虫下し犬チョコ、犬チョコシロップ】

1日1回のみ投与し、その後便の中や肛門の周りに虫がないかを調べます。

虫が確認できた場合、必ず初回投与日から10日間の間隔を空けて2回目の投薬をしてください。虫が見られなくなりましたら投薬を中止してください。