

2020年7月改訂

動物用医薬品

犬の虫下し 犬チョコシロップ

犬を飼育するのに一番大切なことは駆虫です。寄生虫のために体を弱らせ、色々な病気を併発します。定期的に駆虫を行いましょう。

効能又は効果

犬回虫の駆除

用法及び用量

計量キャップによって本剤の所定量を採り、スポイト又は注射筒等を用いて経口投与する。投与量は体重1kg当たり1回0.5mLとする。

※与える量の大体の目安は次の通りです。

体重	1kg	0.5 mL	3kg	1.5 mL
	5kg	2.5 mL	10kg	5 mL
	15kg	7.5 mL	20kg	10 mL

(何れも1回量と成ります。)

成分

本剤100mL中

クエン酸ピペラジン	30.0g	白糖	30.0g
(ピペラジンクエン酸塩無水物として26.3g含有)			
安息香酸ナトリウム	0.1g		

使用上の注意

【一般的注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) 効能・効果において、定められた目的のみに使用すること。

【犬に対する注意】

1. 副作用
(1) 本剤の使用により、激しい下痢、嘔吐、その他異常が認められた時は使用を中止し、獣医師に相談すること。
2. 相互作用
(1) 本剤の使用により、フェノチアジン系トランキライザーの副作用が増強されることがある。

【取扱い上の注意】

- (1) 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。

【保管上の注意】

- (1) 飲食物、食器、小児の玩具等と区別し、小児の手の届かない所に保管すること。
- (2) 専用紙箱に入れて光を避け、なるべく涼しい所に保管すること。
- (3) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ換えないこと。



製造販売元

内外製薬株式会社

〒639-2200 奈良県御所市1568番地

<http://www.naigai-pet.com>


TEL: 0745-65-1156

(9:00~17:00 土、日、祝日は除く)

上手な虫下しの与え方

【内部寄生虫の種類】


犬回虫




猫回虫




犬鉤虫(いぬこうちゅう)



瓜実条虫(うりざねじょうちゅう)



瓜実条虫(拡大図)



※弊社虫下し商品は、条虫には効果がありません。

【使用に際しての注意】

投与量は体重により違いますので、各製品の添付文書に記載された用量をお守りください。
また、製剤によりそれぞれ効能・効果が違いますので、ご注意ください。

生後3ヵ月以上の生体にはご使用いただけますが、体調や健康状態が悪い場合はご使用をお控えください。

なお、「ネオ 犬の虫下し犬チョコ」「犬チョコシロップ」は犬専用となっております。猫には使用しないで下さい。

虫下しは基本的には、糞便検査後の投与となりますが、糞便中または肛門周囲に成虫が認められる場合は以下の方法をおすすめします。

消化管内に寄生虫が存在するか明確でない場合は、1回のみの投与を推奨します。

【ネオ 犬の虫下し犬チョコ、犬チョコシロップ】

1日1回のみ投与し、その後便の中や肛門の周りに虫がいないかを調べます。

虫が確認できた場合、必ず初回投与日から10日間の間隔を空けて2回目の投薬をしてください。虫が見られなくなりましたら投薬を中止してください。